

# Snuitje zegt nee tegen antibiotica bij diarree

**Elk kind weet dat poep vol zit met bacteriën.** Veel volwassenen hebben de ervaring dat je diarree krijgt door het slikken van antibiotica. Antibiotica hebben dus invloed op je darmen, maar zijn antibiotica geïndiceerd bij diarree? Heeft het zin een bacteriekweek te doen bij diarree?

TEKST SNUITJE | FOTO KJELL POSTEMA

## Geringe diarree

Als je ziet hoe vaak honden iets van straat eten, of drinken uit een vieze sloot, dan is het verwonderlijk dat honden niet vaker diarree hebben. Het lichaam heeft een prima eigen immuunsysteem en opgelopen schade herstelt meestal snel. Bij een verder gezonde hond is een behandeling van acute diarree meestal niet nodig. De problemen verdwijnen vanzelf.

## Matige diarree

Het wordt vervelender als de hond in huis poept, pijn heeft bij het poepen of naast de diarree ook braakklachten ontwikkelt. Ook deze diarree herstelt meestal vanzelf, maar de patiënt en zijn baasje kunnen een tijdelijke ondersteuning vaak erg waarderen. De tijdelijke behandeling bestaat vaak uit voederadditieven als Finidiar®, Canikur-pro® of medicijnen als salazosulfapyridine, metoclopramide of Cerenia®. Bij dieren die dreigen uit te drogen, is een infuus nodig. Een makkelijk verteerbaar voer geeft minder ontlasting en minder diarree. Vaak worden dieren een keer extra ontwormd en bij

Giardia is een behandeling met fenbendazol eerste keus.

## Ernstige diarree

Bij pups met een Parvo-infectie kan een tekort aan witte bloedcellen ontstaan. Om te zorgen dat deze pups niet zieker worden door een secundair optredende bacteriële infectie, kan een breed spectrumantibioticum geïndiceerd zijn. Het antibioticum doet natuurlijk niets aan het virus en kan mogelijk de diarree zelfs verergeren, maar dat is niet de grootste zorg bij deze hondjes. Ook Salmonella kan bij jonge honden leiden tot een bloedvergiftiging, waarbij een antibioticum levens kan redden. Gelukkig zijn honden met Salmonella een zeldzaamheid en worden Nederlandse pups goed geënt tegen Parvo. Bij volwassen honden is het acuut hemorragisch diarree syndroom (AHDS, voorheen HGE: hemorragische gastro-enteritis) een beruchte aandoening. AHDS kan gezonde honden binnen een dag op de knieën krijgen: ze krijgen vanuit het niets ernstige bloederige diarree, geven over met bloedbijmenging en drogen zo snel uit dat de hematocriet, ondanks het bloedverlies,

in eerste instantie snel stijgt. De behandeling bestaat uit infuus, veel infuus, nog meer infuus, uiteraard intraveneus, middelen tegen overgeven en eten zodra de hond het weer binnenhoudt. Onbehandeld gaat de patiënt dood. Met de juiste symptomatische ondersteuning loopt de gemiddelde hond met AHDS na enkele dagen weer op eigen pootjes de kliniek uit, en is hij na een dag of tien weer gezond. Er wordt veel gespeculeerd over de oorzaak van AHDS. Clostridia zouden volgens de een wel (5) en volgens de ander geen rol spelen (1). In een studie maakte het in de uitkomst geen verschil of honden wel of geen amoxiciline en clavulaanzuur kregen (6).

## Chronische of recidiverende diarree

Chronische diarree gaat niet vanzelf over. Recidiverende diarree komt, zoals de naam al doet vermoeden, steeds terug. Korte, tijdelijke of symptomatische behandelingen hebben geen blijvende invloed. Meestal is een langdurige, soms levenslange, behandeling geïndiceerd.