



Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45, 1014AS Amsterdam
020-7400600
receptie@mcvoordieren.nl

Versie: 1
Datum herzien: 24/7/25

Voor het medicijn wat u meekrijgt bestaat geen standaard bijsluiter, vandaar dat het MCD op basis van bekende informatie een beperkte bijsluiter heeft voorzien voor eigenaren.

Het betreft een humaan geregistreerd medicijn, wat wordt voorgeschreven omdat er geen geregistreerd alternatief is.

Paracetamol

Farmaceutische vorm: vloeistof en tabletten

Samenstelling: 24 mg/ml, 120 en 500 mg

Eigenschappen: paracetamol werkt als pijnstillend (centraal niveau, COX-3) en koortsverlagend. Het is geen NSAID en heeft dan ook vrijwel geen ontstekingsremmende werking. Langdurige gebruik bij honden is niet wetenschappelijk onderzocht, lange termijn effecten zijn onbekend.

Doeldieren: er is ervaring met het gebruik van paracetamol bij de hond.

Indicaties: dit medicijn kan in de volgende gevallen gebruikt worden:

- Wanneer NSAID's gecontra-indiceerd zijn
- Multimodale analgesie: toevoeging aan NSAID (chronische pijn) of steroïden (zoals bij neurologische chirurgie)
- Koorts
- Hoofdtrauma (ook oculaire gevallen), hersenchirurgie of meningitis
- Polyarthritis

Waarschuwingen en contra-indicaties: mag niet gebruikt worden bij katten. Mag niet gebruikt worden bij honden die bekend zijn met leverstoornissen. Mag niet gebruikt worden bij honden die bekend zijn met circulatie afwijkingen; dehydratie, hypotensie of hartaandoeningen. Mag niet gebruikt worden bij honden met verminderde nierperfusie (nierpatiënten alleen in goed overleg). Bij hele jonge dieren (jonger dan 6 weken oud) of erg oude dieren is het advies om eerst bloedwaardes te laten controleren.

De resultaten suggereren dat paracetamol de mogelijk heeft om de nierfunctie bij prostaglandine afhankelijke patiënten nadelig te beïnvloeden, hoewel misschien in mindere mate van de NSAID dit doet.

Net als met NSAID's moet paracetamol met voorzichtigheid worden gebruikt onder anesthesie bij patiënten met nier insufficiëntie of hypotensie. Gebruik van metoclopramide kan effect hebben op de opname-snelheid, deze wordt dan verhoogd.

Toediening/dosering:

De gebruikelijke dosering bij de hond is:

10 tot 15 mg/kg 2 tot 3x daags PO gedurende maximaal 7 dagen, indien noodzakelijk de periode daarna 10 mg/kg 2 tot 3x daags PO.

Bij te verwachten langdurig gebruik, vooraf lever- en nierwaarden controleren; waarna periodiek herhalen tijdens behandeling (elke 4 weken).

LET OP! Vanwege de brede range van dosering kan het zijn dat uw voorschrift afwijkt van wat er in deze bijsluiter vermeld staat. Geef nooit hogere doseringen zoals hier aangegeven zonder overleg met uw dierenarts.

Wijze van innemen: oraal.

Bijwerkingen: een toxische dosering van paracetamol kan lijden tot depressieve, kortademigheid, icterus, aangezicht- of pootoedeem, tachypnoe, braken, hypothermie, levernecrose of overlijden.

Interacties met andere geneesmiddelen:**Overige informatie:**

- Hoewel het gebruik van paracetamol naast NSAID's niet is geëvalueerd bij honden, lijkt het redelijk om het te geven als een toevoeging aan een NSAID of andere analgetica voor chronische pijn die niet adequaat behandeld kan worden met NSAID's alleen of wanneer NSAID's gecontra-indiceerd zijn. Bij het combineren van paracetamol met andere analgetica, moeten dierenartsen rekening houden met de renale en hepatische effecten van de andere medicijnen om een geïnformeerde beslissing te nemen. Gebruik van paracetamol naast een NSAID of steroïde is een berekend risico, net als vele andere beslissingen over de regelmatige behandeling door dierenartsen. Zorgvuldige overweging van de prostaglandine-afhankelijke toestand van de nieren.
- Merk op dat de SPC voor Pardale-V aangeeft (dus in de UK): "Dien andere NSAID's niet gelijktijdig of binnen 24 uur na elkaar toe" (Pardale-V SPC). Men is het er algemeen over eens dat twee NSAID's niet samen moeten worden gegeven en we gaan ervan uit dat deze SPC-verklaring is gebaseerd op de aanname dat paracetamol een NSAID is. Paracetamol-producten met een vergunning voor varkens geven daarentegen geen dergelijke waarschuwing (SPC). Bij mensen wordt paracetamol routinematig naast ibuprofen (en andere NSAID's) toegediend voor synergistisch effect en wordt over het algemeen beschouwd als nuttig in een multimodaal analgetisch regime (Sharma & Mehta 2014).
- Paracetamol wordt uitgescheiden in de melk, maar er zijn geen bijwerkingen gemeld (Plumb's 2018); de WSAVA-richtlijnen stellen dat paracetamol over het algemeen veilig is om te gebruiken bij zogende honden (Matthews et al 2014).
- Er is geen onderzoek gedaan naar de minimale leeftijd van de patiënt; wij houden > 6 weken aan, wat in de bijsluiter staat vermeld van Pardale-V®.

Fabrikant: diverse fabrikanten, Healtyparm®, Roter®, Leidapharm®, Teva®, Daro®, Sinaspril®

Bewaarcondities: op een droge plaats bij 15-25 graden