



Medisch Centrum voor Dieren
Isolatorweg 45, 1014AS Amsterdam
020-7400600
receptie@mcvoordieren.nl

Versie: 1
Datum herzien: 24/7/25

Voor het medicijn wat u meekrijgt bestaat geen standaard bijsluiter, vandaar dat het MCD op basis van bekende informatie een beperkte bijsluiter heeft voorzien voor eigenaren.

Het betreft een humaan geregistreerd medicijn, wat wordt voorgeschreven omdat er geen geregistreerd alternatief is.

Trazodon

Farmaceutische vorm: tabletten

Samenstelling: 50 mg en 100 mg

Eigenschappen: trazodon is een humaan antidepressivum. Het behoort tot de niet-selectieve serotonine reuptake inhibitors en serotonine receptor antagonist en werkt via:

- GABA in centraal zenuwstelsel → ↑ serotonine vrijgave in de cerebrale cortex
- Enige α 1-adrenerge receptor blokkade → vasodilatatie
- Gemetaboliseerd door cytochroom P450 (dus vooral via lever) en uitscheiding via de nieren.

Dit resulteert in een rustgevend en anxiolytisch (vermindering van angst) effect.

Doeldieren: er is ervaring met het gebruik van Trazodon bij de hond.

Indicaties: dit medicijn wordt gebruikt bij het gemakkelijk/gemoedelijker maken van postoperatieve bench rust. Bij het verlagen van angst bij de opgenomen dieren (anxiolytica). En bij het beter kunnen verwerken/hanteren van lage stress.

Waarschuwingen en contra-indicaties: Niet gebruiken bij: hart-, lever- en/of nierfalen.

Toediening/dosering:

- Gedurende de eerste 3 dagen: 3.5 mg/kg 2-3x daags per oraal (PO)
- Indien noodzakelijk mag de dosering in de periode daarna (stapsgewijs) verhoogd worden op klinisch effect naar ongeveer: 7 mg/kg 2-3dd PO
- Deze medicatie kan eventueel verhoogd worden tot een maximale dosering van 12 mg/kg 3dd PO

Doe dit alleen in overleg met uw dierenarts.

Let op! Het geneesmiddel heeft ca. 2 uur nodig voordat het werkzame effect optreedt. Voor bijvoorbeeld stressvolle handelingen zou het geneesmiddel de avond van te voren al gegeven kunnen worden.

Wijze van innemen: oraal.

Bijwerkingen:

- Maagdarm klachten: braken, diarree, pica (zeer heftige drang tot eten)
- Sedatie, lethargie
- Ataxie (verminderde coördinatie)
- Hypotensie (verlaagde bloeddruk)
- Excitatie → verhoogd angst- en/of agressief gedrag
- Hijgen
- Priapisme (aanhoudende erectie)
- **Serotonine syndroom** (zelden, maar kan wel levensbedreigend zijn!)
 - Gastro-intestinale symptomen: *braken, diarree, verminderde eetlust*
 - Autonoom hyperactiviteit: *verhoogde hartfrequente, gedilateerde/wijde pupillen*
 - Neuromusculaire symptomen: *tremors (trillingen), stijfheid, excitatie*
 - *Tachypnea* (verhoogde ademhaling), *dyspnea* (moeite met ademen), *verhoogde temperatuur, verhoogde/verlaagde bloeddruk.*

De behandeling is gericht op het elimineren van de 'toxinen', behandeling/ondersteuning van Klinische symptomen en toediening van een serotonine receptor antagonist (= antihistaminicum)

→ hoewel hier geen onderzoek naar verricht is:

Tavegil – Clemastine

Hond: 0.5 – 1.5 mg per dier IV of IM (anafylaxie)

Kat: 0.5 – 1.5 mg per dier IV of IM

Cyproheptadine (Periactin) – ervaring in het gebruik bij paarden

Interacties met andere geneesmiddelen: Tramadol werkt eveneens op serotonine huishouding.

In de literatuur is de combinatie wel beschreven, maar dit mag alleen in overleg met uw dierenarts worden gegeven! Amitraz = anti-parasitica. Geïndiceerd bij runderen, schapen, varkens, werkzaam tegen schurftmijt, luizen en teken. Fluoxetine, Clomipramine, Selegiline. Dit zijn SSRI, tricyclische antidepressiva, MAO-remmers, respectievelijk (= humane antidepressiva).

Fabrikant: diverse fabrikanten, Sandoz®, Neuraxpharm®

Bewaarcondities: op een droge plaats bij 15-25 graden